

# ಸಿಐಐ-ಎಫ್‌ಪಿಒ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಫ್‌ಪಿಒ ಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಸೇವಾ ಘಟಕ

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ  
ಅರಿಶಿನದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು





- ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ

## ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಎನ್-70 ಕೆಜಿ; ಪಿ-24 ಕೆಜಿ; ಕೆ- 30 ಕೆಜಿ. ಎನ್‌ಪಿಕೆ ಯನ್ನು 3 ಬೇರೆಬೇರೆ ಡೋಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ರೈಯೂಮ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮಟೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಯಷ್ಟು ಪಾಸೆಲೊಯಿಮೈಸೆಸ್ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಥವಾ ಪೊಚೊನಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ನೆನೆಸಿ.
- ರೈಯೂಮ್ ರಾಟ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5ಮಿಲಿ ಫಾಸ್ಫೊನಿಕ್ ಆಸಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೆನೆಸಿ

ಹಂತ	ಶಿಫಾರಸು	ಡೋಸೇಜ್ (ಎಕರೆ)
ಬಿತ್ತನೆ	ಎಂಡೊಮೈಕೊ	125 ಗ್ರಾಂ
30-45 ಡಿಎಎಸ್	ಫೆರೊಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	10 ಕೆಜಿ
	ಸಲ್ಫರ್ ಬೆಂಟೊನೈಟ್	10 ಕೆಜಿ
	ಚೆಲೆಟೆಡ್ ರಿಫಿಂಕ್	500 ಗ್ರಾಂ
ರೈಯೂಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್	10 ಕೆಜಿ
	ಸೀ ವೀಡ್	300 ಗ್ರಾಂ

# ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ



ಹಂತ	ಶಿಫಾರಸು	ಡೋಸೇಜ್ (/ಲೀಟರ್)
ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ	ಮಲ್ಟಿಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣ	2-3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ
	20:20:20	5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ಚೀಲೇಟೆಡ್ ಐರನ್	1-2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ
	12:61:00	5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ
	ಸಲ್ಫರ್	3 ಮಿಲೀ/ಲೀ
ರೈಝೂಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ಸೀ ವೀಡ್	2-3 ಮಿಲೀ/ಲೀ
	00:52:34	5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ
ರೈಝೂಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	13:00:45	5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ
	ಮಲ್ಟಿಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮಿಶ್ರಣ	3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ
ರೈಝೂಮ್ ಪಕ್ವತೆ	00:00:50	5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ
	ಪ್ರೊಟೀನ್ ಹೈಡ್ರೊಲೈಸೇಟ್	2 ಮಿಲೀ/ಲೀ
	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್	3 ಮಿಲೀ/ಲೀ



## ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಬೆಳೆ ಸರದಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಕೀಟ/ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಲು ಬೆಳೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ/ಋತುಕಾಲಿಕ ಹೂಬಿಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ.
- ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 30 ಮಿಲಿ ಯಷ್ಟು ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಲೀಫ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಬಾಚ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ.
- ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.



Thanks